

* 2015年3月改訂（第3版）

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

貯 法：室温保存、火気注意

使用期限：ラベル等に記載

指定医薬部外品 外皮消毒剤

販売名「サニコットEQ」

製品名「サニコットEQ Cap 100P」「サニコットEQ Cap 200P」
「サニコットEQ II パウチ 200P」

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起きやすくなる）

次の人は使用しないこと

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】

使用時本品を開けて脱脂綿をとり、そのまま手指に塗布又は塗擦する。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 粘膜へは使用しないこと。

【成分】

成分	1 パック中 (容器タイプ) 注1)		1 包中 (個包装タイプ) 注1)
	86 mL	173 mL	1.44 mL
日局エタノール			
医療脱脂綿	19.2 g (4 cm×4 cm、100 枚入)	38.4 g (4 cm×4 cm、200 枚入)	0.32 g (4 cm×4 cm、2 枚入)

注 1) 76.9~81.4 vol %エタノールをそれぞれ 104 mL、208 mL 及び 1.73 mL 含む。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
4. 火気に近づけないこと。

脱脂綿の表面や内部に黒や黄色の小さい斑点状のものが見られることがありますが、これは綿花の果皮や種子の一部ですので安心してお使いください。

【包装】

1. 容器タイプ
サニコット EQ Cap 100 枚入 (4 cm×4 cm)
サニコット EQ Cap 200 枚入 (4 cm×4 cm)
2. 個包装タイプ
サニコット EQ II パウチ 2 枚×200 包入 (4 cm×4 cm)

*** 【消費者相談窓口】****丸三産業株式会社**

〒795-8508 愛媛県大洲市徳森 1349 番地

お客様相談室 TEL : 0893-25-1486

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

* <製造販売元>

丸三産業株式会社

〒795-8508 愛媛県大洲市徳森 1349 番地