

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

貯 法：室温保存、火気注意

使用期限：化粧箱等に記載

第3類医薬品 外用殺菌消毒剤

販売名「サニコットME」

製品名「サニコットME II パウチ200P」

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起きやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 損傷のある皮ふ。
- (2) 目のまわり、粘膜等。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書並びに本製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

(用法及び用量に関連する注意)

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
2. 目に入らないように注意すること。

万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
3. 外用にのみ使用すること。
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがある。
5. 広範囲又は長時間使用する場合、蒸気の吸入に注意すること。
6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。

【成分】

成分	1包中 ^{注1)}
日局エタノール	1.44mL
医療脱脂綿	0.32g (4cm×4cm、2枚入)

注 1) 76.9~81.4vol%エタノールを 1.73mL 含む。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
4. 火気に近づけないこと。
5. アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿を継ぎ足して使用しないこと。
6. 開封後はすみやかに使用すること。
7. 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。

脱脂綿の表面や内部に黒や黄色の小さな斑点状のものが見られることがありますが、これは綿花の果皮や種子の一部ですので、安心してお使いください。

【包装】

1. 個包装タイプ
 サニコット ME II パウチ 2枚×200包入(4cm×4cm)

【消費者相談窓口】**丸三産業株式会社**

〒795-8508 愛媛県大洲市徳森 1349 番地

お客様相談室 TEL : 0893-25-1486

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

TEL : 0120-149-931 (フリーダイヤル)

<製造販売元>

丸三産業株式会社

〒795-8508 愛媛県大洲市徳森 1349 番地