

* 2017年1月 改訂（第2版）

2015年3月 制定（第1版）

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

貯 法：室温保存、火気注意

* 使用期限：化粧箱等に記載

指定医薬部外品 外皮消毒剤

販売名「サニコットβa」

製品名「サニコットパウチ 60P」「サニコットパウチ 200P」

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】

通常1回1包を用い、適用部位を洗浄または清拭する。

【用法及び用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 粘膜へは使用しないこと。

* (5) やけどのような痛みを伴う炎症を起こすことがあるので、溶液の状態です長時間皮膚と接触させないこと。

【成分】

成分	1包中
日局クロルヘキシジングルコン酸塩液	0.0087mL
日局エタノール	1.28mL
医療脱脂綿	0.32g (4cm×4cm、60、200包入)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
- (4) 火気に近づけないこと。

脱脂綿の表面や内部に黒や黄色の小さな斑点状のものが見られることがありますが、これは綿花の果皮や種子の一部ですので安心してお使いください。

【包装】*** 個包装タイプ**

1. サニコットパウチ 60包入(4cm×4cm)
2. サニコットパウチ 200包入(4cm×4cm)

【消費者相談窓口】**丸三産業株式会社**

〒795-8508 愛媛県大洲市徳森 1349 番地

お客様相談室 TEL : 0893-25-1486

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

＜製造販売元＞

丸三産業株式会社

〒795-8508 愛媛県大洲市徳森 1349 番地