

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

貯 法：室温保存、火気注意

使用期限：ラベル等に記載

指定医薬部外品 外皮消毒剤

販売名「コットンパック MEH α 」

製品名「コットンパック MEH Cap 104P」「コットンパック MEH Cap 200P」

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 幹部が広範囲の人。
- (3) 深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

【用法・用量】

使用時本品を開いて脱脂綿をとり、適応部位に塗布する。

【用法及び用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

- (3) やけどのような痛みを伴う炎症をおこすことがあるので、溶液の状態です長時間皮膚と接触させないこと。
(4) 外用にのみ使用すること。
(5) 粘膜へは使用しないこと。

【成分】

成分	1パック中(容器タイプ)	
日局クロルヘキシジングルコン酸塩液	0.156mL	0.3mL
日局エタノール	83.2mL	160mL
医療脱脂綿	20.0g (4cm×4cm、104枚入)	38.4g (4cm×4cm、200枚入)

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
4. 火気に近づけないこと。

脱脂綿の表面や内部に黒や黄色の小さい斑点状のものが見られることがありますが、これは綿花の果皮や種子の一部ですので安心してお使いください。

【包装】

容器タイプ

コットンパック MEHCap 104枚入(4cm×4cm)

コットンパック MEHCap 200枚入(4cm×4cm)

【消費者相談窓口】

丸三産業株式会社

〒795-8508 愛媛県大洲市徳森 1349 番地

お客様相談室 TEL : 0893-25-1486

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

<製造販売元>

丸三産業株式会社

〒795-8508 愛媛県大洲市徳森 1349 番地