


エタノール含浸綿
〈イソプロパノール添加〉

N サニコット® MEI₂ Cap

4×4
cm cm

104枚



販売名	サニコット MEI ₂		
成分 (薬液100mL中)	日局 エタノール	83mL	
	日局 イソプロパノール	3.7mL	
	日局 精製水	適量	
内容量 (1パック中)	薬液 91.8mL 脱脂綿 20g (4cm×4cm、104枚)		
効能・効果	手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒		
用法・用量	そのまま塗擦、清浄用として用いる。		

【△使用上の注意】

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

(1) 損傷のある皮膚。(2) 目の周囲、粘膜等。

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある。

脱脂綿の表面や内部に黒や黄色の斑点状のものがみられることがありますが、これは綿花の果皮や種子の一部ですので、安心してお使いください。



4 560430 410856

登録コード

JANコード	4560430 410856
内ITFコード	2 4560430 410850
外ITFコード	1 4560430 410853

製品規格

製品入数(枚)	104
製品サイズ(mm)	W125×D125×H40
製品重量(g)	115
内ケース入数(個)	24
内ケースサイズ(mm)	W386×D260×H166
内ケース重量(g)	3,000
外ケース入数(個)	96(24×4)
外ケースサイズ(mm)	W540×D402×H361
外ケース重量(g)	13,000
荷姿(合)	1

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
- (5) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- (6) アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具等を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿を縫ぎ足して使用しないこと。
- (6) 開封後はすみやかに使用すること。
- (7) 使用後はトイレに流さなくて、衛生的に処理すること。

製造販売元

丸三産業株式会社

愛媛県大洲市徳森1349番地

●お客様相談室 TEL(0893)25-1486

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

<https://www.marusan-sangyo.co.jp/>